

Inzet en testbeleid verloskundigen

Deze bijlage hoort bij de [LCI richtlijn COVID-19](#) die als een gezamenlijk advies van KNOV en RIVM is opgenomen en gaat om de maatregelen rond inzet en testbeleid verloskundigen en kraamzorg.

Een medewerker met minimaal 24 uur symptomen van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) kan GETEST¹ worden:

Totdat de testuitslag bekend is:

- Medewerkers met koorts: thuisblijven
- Medewerkers zonder koorts: bij voorkeur thuisblijven of anders persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)² gebruiken zodat de medewerker de cliënt niet besmet.

Als de testuitslag bekend is:

- Indien de test negatief is: aan het werk met algemene hygiënemaatregelen.
- Indien de test positief is: thuisblijven tot 24 uur klachtenvrij.

¹ *Neem contact op met de werkgever voor de procedure rondom testen. De regie voor het testen ligt bij de GGD in de regio (zie <https://gqdqhor.nl/thema/testen-covid-19>).*

² *PBM om te voorkomen dat de medewerker het virus verspreidt. Dit bestaat uit een chirurgisch mondneusmasker en wegwerphandschoenen voor de medewerker. Het mondneusmasker kan 3 uur achtereen gedragen worden (bij verschillende patiënten). De handschoenen moeten per patiënt gewisseld worden.*

Meer informatie

[Algemene uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers](#)